

Übersicht zur Impfempfehlung

für erwachsene CED-Patienten vor bzw. während einer Immunsuppression

Quelle: Epidemiologisches Bulletin RKI 04/2022 + Bundesgesundheitsblatt 2019 - 62:494–515

Impfung	Antikörper Titer vor Impfung	Standardimpfung/ Indikationsimpfung	Impfung vor Start Immunsuppression	Impfung während Immunsuppression	Handelsnamen
TOTIMPFSTOFFE					
Tetanus-Diphtherie	nein	Standardimpfung	1 Impfung, falls nicht in den 10 Jahren zuvor	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Td pur® TD Merieux®
Poliomyelitis	nein	Standardimpfung	1 Impfung, falls nicht Grundimmunisierung + einmalige Auffrischung jemals erfolgt ist	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	IPV Merieux®
Hepatitis B	ja (anti HBs)	Standardimpfung	3 Impfungen, falls keine AK-Titer. Evtl. Zusatzimpfung nach Titerkontrolle	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Engerix® HBVAXPRO® Fendrix® HEPLISAV B®
Influenza	nein	Indikationsimpfung	jährlich-saisonal im Herbst	jährlich-saisonal im Herbst	jährlich wechselnd
Pneumokokken	ja, vor Wiederholungsimpfung	Indikationsimpfung	2 Impfung(13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung	2 Impfung(13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung	Pneumovax® Prevenar®

					Synflorin®
Humanes Papilloma Virus (HPV)	nein	Standardimpfung	2-3 Impfungen	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Gardasil 9® Cervarix®
Herpes zoster	Bei Pat. > 50 Jahren nicht notwendig	Indikationsimpfung	2 Impfungen	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Shingrix® CAVE: Zostavax® ist ein Lebendimpfstoff
Pertussis	nein	Standardimpfung	Auffrischung mit TD in Kombination für Erwachsene	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Monoimpfstoff nicht vorhanden
FSME	nein	Indikationsimpfung	2-3 Impfungen, Risikogebiete in Deutschland beachten!	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	Encepur® FSME Immun®

LEBENDIMPFFSTOFFE

Masern-Mumps-Röteln	ja, bei unklarer Impfsituation / Infektanamnese	Impfung kontraindiziert!	ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u> mind. 4-6 Wochen vor Start der Immunsuppression mind. 3 Monate nach Ende einer Immunsuppression	Nein! Impfung kontraindiziert!	Priorix® M-M-RVAX-PRO®
Varizellen	ja, bei unklarer Impfsituation / Infektanamnese	Impfung kontraindiziert!	ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u> mind. 4-6 Wochen vor Start der Immunsuppression mind. 3 Monate nach Ende einer Immunsuppression	Nein! Impfung kontraindiziert!	Varilix® Varivax®
Gelbfieber	nein	Impfung kontraindiziert!	Einmalige Impfung, Auffrischung nach 10 Jahren möglich	Nein! Impfung kontraindiziert!	Stamaril®