

Mit dieser Liste wollen wir Ihnen einen Überblick über die bei CED eingesetzten Medikamente geben. Sie finden hier Wirkstoffgruppen, Handelsnamen, Darreichungsformen und häufige Nebenwirkungen.

Wirkstoff: <b>Glukokortikoide</b> (systemisch wirksames Kortison)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nachteil/ ggf. Nebenwirkungen	Indikation
Prednisolon® Prednison® Decortin (H)® Solu-Decortin® Rectodelt® Betnesol®	Tabletten Schaum Einlauf	Gewichtszunahme, Vollmondgesicht, Büffelnacken, Umverteilung des Fettgewebes, Akne, Striae, Arterielle Hypertonie, Diabetes, Psychische Störungen, (Psychosen, Depression), Schlafstörung, kognitive Defizite, Osteoporose, Katarakt und Glaukom, Erhöhtes Infektionsrisiko, gestörte Wundheilung, erhöhte Thromboseneigung.	Morbus Crohn Colitis Ulcerosa  Im Schub zur Remissionseinleitung. <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> Ausschleichen der Therapie wichtig! Kein Dauermedikament!

Wirkstoff: <b>Budesonid</b> (topisch wirksames Kortison)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nachteil/ ggf. Nebenwirkungen	Indikation
Entocort® Budenofalk®	Kapseln Granulat Rektalschaum Einläufe	Gewichtszunahme, Vollmondgesicht, Büffelnacken, Umverteilung des Fettgewebes, Akne, Striae, Arterielle Hypertonie, Diabetes, Psychische Störungen, (Psychosen, Depression), Schlafstörung, kognitive Defizite, Osteoporose, Katarakt und Glaukom, Erhöhtes Infektionsrisiko, gestörte Wundheilung, erhöhte Thromboseneigung.	Morbus Crohn Colitis Ulcerosa  Im Schub zur Remissionseinleitung.
Cortiment® (NUR CU)	Kapseln		<p><b><u>Gut zu wissen:</u></b></p> <p>NW wie bei systemischen Glukokortikoiden möglich abhängig von Dosis und Behandlungsdauer.</p>

Wirkstoff: <b>Sulfasalazin</b> (5-Aminosalicylat)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Azulfidine RA® Pleon® Sulfasalazin®	Tabletten	Infekte, Blutbildveränderungen, leichte allergische Reaktionen.	Colitis ulcerosa – mit Gelenkbeteiligung.
			<p><b><u>Gut zu wissen:</u></b> Dosisabhängige Reduktion der Fertilität beim Mann</p>

Wirkstoff: **MESALAZIN** (5-Aminosalicylat)

Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Mezavant® Salofalk® Pentasa® Claversal®	Tabletten Granulat Rektal-Schaum Einläufe Zäpfchen Klysmen	Durchfall, Kopfschmerzen, Bauchschmerz, Blähungen, Übelkeit & Erbrechen, Schwindel, Fieber, Überempfindlichkeitsreaktionen, Atemnot, Pankreatitis, Myokarditis, Myalgie, Arthralgie, Blutbildveränderungen, Leberfunktionsstörung, Juckreiz, Haarausfall, Nierenfunktionsstörung (interstitielle Nephritis) - evtl. extraintestinale Manifestation und keine Medikamenten-NW.	Colitis ulcerosa <ul style="list-style-type: none"> <li>- leichter bis mittelschwerer Verlauf zur Remissionseinstellung und -erhaltung</li> <li>- Carzinomprophylaxe</li> </ul> Selten M. Crohn (leichter bis mittelschwerer MC im Coecalbereich) <hr/> <p><b>Gut zu wissen:</b> Präparate durch unterschiedliche Galenik nicht untereinander austauschbar (Freisetzung des Wirkstoffs in verschiedenen Abschnitten im Darm!)</p>

Wirkstoff: **AZATHIOPRIN – 6-Mercaptopurin**

Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Azafalk® Azaimmun® Azamedac® Imurek®	Tabletten	Knochenmark-Depression (Lymphopenie gewünscht), Agranulozytose (lebensbedrohlich)!, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerz, Fieber, Myalgie, Arthralgie, Hautausschlag, Kopfschmerz	Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Chronisch aktiver, mittelschwerer Verlauf Dosierung gewichtsabhängig:

Puri-Nethol®		Pankreatitis (1-3%), Infektionen, Lymphome, weißer Hautkrebs ( Basaliom, Plattenepithelkarzinom ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AZA: 2-2,5 mg/kg Körpergewicht</li> <li>• 6-MP: 1,5 mg/kg Körpergewicht</li> </ul> <p><b>Gut zu wissen:</b> Sonnenlicht meiden und 1 x/Jahr Hautarzt-Screening! Regelmäßige BB-Kontrollen. Wirkungseintritt erst nach ca. 8 – 12 Wochen!</p>
--------------	--	--	---

Wirkstoff: <b>METHOTREXAT</b>			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
MTX® Lantarel® Metex® Methotrexat®	Tabletten Fertigspritzen/-Pen Injektionslösung	Stomatitis, Dyspepsie, Pneumonie, Infekt-Anfälligkeit steigt, Aggranulozytose, Hepatotoxizität, Übelkeit, Erbrechen	Morbus Crohn Reservemedikament bei Morbus Crohn, steroidrefraktärem oder abhängigem Verlauf. Zur Remissionsinduktion und Erhaltung. <p><b>Gut zu wissen:</b> Kontraindiziert bei Schwangerschaftswunsch und während der Schwangerschaft da teratogen! Wegen verminderter Aufnahme von Folsäure muss Folsäure rezeptiert werden. Einnahme am Folgetag!</p>

Wirkstoffe: <b>Infliximab/Adalimumab/Golimumab</b> (TNF $\alpha$ Blocker/monoklonaler Antikörper)			
<b>Handelsnamen</b>	<b>Darreichungsformen</b>	<b>Nebenwirkungen</b>	<b>Indikation</b>
Remicade® Inflectra® Flixabi® Zessly®	Trockensubstanz für Infusion	akute Infusionsreaktionen (Anaphylaxie bei Infliximab), Reizung an Injektionsstellen (Adalimumab und Golimumab), Infektionen, Hautveränderungen, Malignome, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Mittelschwere bis schwere Erkrankung. <hr/> <b><u>Gut zu wissen:</u></b> Simponi® nur für Colitis ulcerosa zugelassen! Mittelschwere bis schwere Erkrankung. Vor Therapiestart Tuberkulose testen!
Remsima®	Trockensubstanz für Infusion und Fertigspritze/-Pen		
Humira® Simponi® Imraldi® Hyrimoz® Amgevita® Hulio® Idacio®	Fertigspritzen/ -Pen		

Wirkstoff: Ustekinumab

Handelsname	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Stelara®	Infusionslösung/ Fertigspritze	Allergische Reaktionen, Infektionen, Durchfall, Übelkeit, Müdigkeitsgefühl, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Juckreiz, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Halsentzündung, Zahnentzündungen, Rötung und Schmerzen an der Injektionsstelle, Depression	M.Crohn und Colitis ulcerosa bei Erwachsenen <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> 1. Applikation i.v. (6 mg/kg), weitere Therapie als s.c. Injektion alle 8 – 12 Wochen.

Wirkstoff: **Vedolizumab** (monoklonaler Antikörper – darmselektiv)

Handelsname	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Entyvio®	Trockensubstanz für Infusion Fertigspritze/-Pen	Infekte, Lokale Reizungen, Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Magen-Darm-Entzündung, Ekzem, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa Mittelschwere bis schwere Erkrankung <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> Wirkeintritt nach 6 – 14 Wochen!

Wirkstoff: <b>Ciclosporin - Tacrolimus</b> (Calcineurininhibitoren)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Sandimmun® Prograf®	Ampullen Kapseln	Parästhesien, Hypertrichose, Hypertension, Tremor, Niereninsuffizienz, Kopfschmerzen, Infektionen, Lebertoxizität, Störung Magen/Darmtrakt	Colitis ulcerosa. bei schwerem/fulminantem und bei refraktärem Verlauf. <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> Medikamente aus der Transplantationsmedizin: Off label use!  Therapieüberwachung mit Spiegelkontrollen wichtig, Spiegelbestimmung vor Einnahme!

Wirkstoff: <b>Metronidazol, Ciprofloxacin, Rifaximin</b> (Antibiotika)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Clont® Ciprobay® Xifaxan®	Tabletten	Übelkeit, Durchfall, Hautausschläge, Kopfschmerz, Fieber, Juckreiz	Septische Komplikationen, Fisteln bei MC, bakt. Fehlbesiedlung, Pouchitis, Clostridium difficile Infektion, fraglich luminaler Crohn mit Colonbefall. <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> CAVE: orale Verhütungsmittel

			evtl. unwirksam.
--	--	--	------------------

Wirkstoff: **Olsalazin** (5-Aminosalicylat)

Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Dipentum® Asacolitin®	Tabletten	Depressionen, Leberentzündung, Blutarmut, Schwindel, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Juckreiz, Fieber, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Haarausfall	Leichter bis mittelschwerer Schub der Colitis ulcerosa und zur Rezidivprophylaxe.

Wirkstoff: **Escherichia coli Stamm Nissle 1917** (Probiotika)

Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Mutaflor®	Kapseln	Blähungen, Durchfall bei Überdosierung	Colitis ulcerosa, nur zur Remissionserhaltung <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> Einziges zugelassenes Probiotikum



			kum, Kostenübernahme nur bei Mesalazinunverträglichkeit!
--	--	--	--

Wirkstoff: Eisenmaltol			
<b>Handelsname</b> Feraccru®	<b>Darreichungsformen</b> Kapseln	<b>Nebenwirkungen</b> Bauchschmerzen, Flatulenz, Akne, Durst, abdominelle Beschwerden	<b>Indikation</b> Eisenmangel bei erwachsenen Patienten mit CED).  <b>Gut zu wissen:</b> Dosis 2 x 1 Kps. (à 30 mg)

Wirkstoff: <b>Loperamid,Cholestyramin</b> (symptomatische Therapie)			
Handelsnamen	Darreichungsformen	Nebenwirkungen	Indikation
Imodium® Lopedium® Tinctura opi®	Kapseln Tabletten Lösung	Verstopfung, Müdigkeit, Übelkeit, Sodbrennen, Blähungen, Völlege- fühl, Durchfall	M.Crohn ( z.B. nach Entfernung des terminalen Ileum )
Quantalan® Lipocol®	Kautabletten Pulver		<b>Gut zu wissen:</b> Bei langfristiger Anwendung kann es zu Mangel an fettlöslichen Vi- taminen kommen
Wirkstoff: <b>Tofacitinib</b> (Januskinase(JAK)-Inhibitor)			



<b>Handelsnamen</b>	<b>Darreichungsformen</b>	<b>Nebenwirkungen</b>	<b>Indikation</b>
Xeljanz®	Tabletten	Leberwerterhöhung, Infektionen, Blutbildveränderungen, Kopfschmerzen, Arthralgie, Nasopharyngitis	Colitis ulcerosa bei erwachsenen Patienten <hr/> <b>Gut zu wissen:</b> Orale Einnahme 2x täglich

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Stand 26.08.2020