



Berechnung Mayo-Score (CU)

Der Score dient der Aktivitätsbeurteilung bei Colitis ulcerosa. Ohne den endoskopischen Befund spricht man vom partiellen (partial) Mayo Score.

| Kriterium | Punkte | Punkte |
|--------------------------------|---|--------|
| Stuhlfrequenz pro Tag | <ul style="list-style-type: none"> • normal: 0 • 1-2 Stühle: 1 • 3-4 Stühle: 2 • > 5 Stühle: 3 | |
| Rektaler Blutabgang | <ul style="list-style-type: none"> • kein Blut: 0 • Blutstreifen bei weniger als 50% der Stühle: 1 • Deutliche Blutbeimengung meistens: 2 • Auch Blut ohne Stuhl: 3 | |
| Endoskopischer Befund | <ul style="list-style-type: none"> • normaler Befund oder inaktive Erkrankung: 0 • milde Colitis (Erythem, leicht spröde Schleimhaut): 1 • moderate Colitis (deutliches Erythem, Erosionen, Gefäß Muster verschwunden): 2 • schwere Colitis (Ulzerationen, spontane Blutungen): 3 | |
| Globale Beurteilung des Arztes | <ul style="list-style-type: none"> • normal: 0 • milde Erkrankung: 1 • moderate Erkrankung: 2 • schwere Erkrankung: 3 | |
| Summe | | |

Ergebnis:

- 0 bis 1 Punkt = Remission
- 2 bis 5 Punkte = milde Erkrankung
- ab 6 Punkte = moderate bis schwere Erkrankung