



## Übersicht zur Impfempfehlung

für erwachsene CED-Patienten vor bzw. während einer Immunsuppression

Quelle: Epidemiologisches Bulletin RKI 05/2023 + Bundesgesundheitsblatt 2019 · 62:494–515

Impfung	Antikörper Titer vor Impfung	Standardimpfung/ Indikationsimpfung	Impfung <u>vor</u> Start Immunsuppression	Impfung <u>während</u> Immunsuppression	Handelsnamen
<b>TOTIMPFSTOFFE</b>					
<b>Tetanus-Diphtherie</b>	nein	Standardimpfung	1 Impfung, falls nicht in den 10 Jahren zuvor	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Td pur®</b> <b>TD Merieux®</b>
<b>Poliomyelitis</b>	nein	Standardimpfung	1 Impfung, falls nicht Grundimmunisierung + einmalige Auffrischung jemals erfolgt ist	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>IPV Merieux®</b>
<b>Hepatitis B</b>	ja (anti HBs)	Standardimpfung	3 Impfungen, falls keine AK-Titer. Evtl. Zusatzimpfung nach Titerkontrolle	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Engerix®</b> <b>HBVAXPRO®</b> <b>Fendrix®</b> <b>HEPLISAV B®</b>
<b>Influenza</b>	nein	Indikationsimpfung	jährlich-saisonal im Herbst	jährlich-saisonal im Herbst	<b>jährlich wechselnd</b>



<b>Pneumokokken</b>	ja, vor Wiederholung - Impfung	Indikationsimpfung	2 Impfung (13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung	2 Impfung (13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung	<b>Pneumovax®</b> <b>Prevenar®</b> <b>Synflorin®</b>
<b>Humanes Papilloma Virus (HPV)</b>	nein	Standardimpfung	2-3 Impfungen	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Gardasil 9®</b> <b>Cervarix®</b>
<b>Herpes zoster</b>	Bei Pat. > 50 Jahren nicht notwendig	Indikationsimpfung	2 Impfungen	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Shingrix®</b> <b>CAVE: Zostavax® ist ein Lebendimpfstoff</b>
<b>Pertussis</b>	nein	Standardimpfung	Auffrischung mit TD in Kombination für Erwachsene	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Monoimpfstoff nicht vorhanden</b>
<b>FSME</b>	nein	Indikationsimpfung	2-3 Impfungen, Risikogebiete in Deutschland beachten!	Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus	<b>Encepur®</b> <b>FSME Immun®</b>

**LEBENDIMPFFSTOFFE**

<b>Masern-Mumps-Röteln</b>	ja, bei unklarer Impfsituation / Infektanamnese	<b>Impfung kontraindiziert!</b>	ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u> mind. 4-6 Wochen <u>vor</u> Start der Immunsuppression mind. 3 Monate <u>nach</u> Ende einer Immunsuppression	<b>Nein!</b> <b>Impfung kontraindiziert!</b>	<b>Priorix®</b> <b>M-M-RVAX-PRO®</b>
<b>Varizellen</b>	ja, bei unklarer Impfsituation / Infektanamnese	<b>Impfung kontraindiziert!</b>	ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u>	<b>Nein!</b> <b>Impfung kontraindiziert!</b>	<b>Varilix®</b> <b>Varivax®</b>



			mind. 4-6 Wochen <b>vor</b> Start der Immunsuppression  mind. 3 Monate <b>nach</b> Ende einer Immunsuppression		
<b>Gelbfieber</b>	nein	<b>Impfung kontraindiziert!</b>	Einmalige Impfung, Auffrischung nach 10 Jahren möglich	<b>Nein! Impfung kontraindiziert!</b>	<b>Stamaril®</b>

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Stand Oktober 2023