



Anti-TNF- α -Antikörper Wirkstoff Adalimumab								
Präparat	Humira®	Amgevita®	Hukyndra®	Hulio®	Hyrimoz®	Idacio®	Imraldi®	Yufllyma®
Hersteller	AbbVie	Amgen	Stadapharm	Mylan	Sandoz	Fresenius	Biogen	Celltrion
Art der Anwendung	subkutan							
Darreichungsform	20 mg Fertigspritze, 40/80 mg Fertigspritze/ Fertigpen	20/40 mg Fertigspritze, 40 mg Fertigpen	40 mg Fertigspritze/ Fertigpen, 80 mg Fertigspritze	40 mg Fertigspritze/ Fertigpen/ Durchstechflasche	20/40/80 mg Fertigspritze 40/80 mg Fertigpen	40 mg Fertigspritze/ Fertigpen/ Durchstechflasche	40 mg Fertigspritze/ Fertigpen	40/80 mg Fertigspritze/ Fertigpen
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn und Colitis ulcerosa							
Induktionsdosis	Morbus Crohn Woche 0 : 160 mg Woche 2 : 80 mg				Colitis ulcerosa Woche 0 : 160 mg Woche 2 : 80 mg			
Erhaltungsdosis	alle 2 Wochen: 40 mg							
Lagerung	im Kühlschrank lagern (2°C-8°C), nicht einfrieren, lichtgeschützt ab Entnahme aus dem Kühlschrank 15-30 Minuten bis zur Verabreichung warten							
Einmalige Aufbewahrung bei max. 25°C (lichtgeschützt)	bis zu 14 Tage			bis zu 8 Wochen	bis zu 21 Tage	bis zu 28 Tage	bis zu 28 Tage	bis zu 31 Tage