



Anti-TNF- α -Antikörper Wirkstoff Infliximab						
Präparat	Remicade®	Flixabi®	Inflectra®	Remsima®	Zessly®	Remsima®
Hersteller	MSD	Biogen	Pfizer	Celltrion	Sandoz	Celltrion
Art der Anwendung	intravenös					subkutan
Darreichungsform	100 mg Durchstechflasche					120 mg Fertigspritze/-pen
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa					
Induktionsdosis	Woche 0 : 5 mg/kg Körpergewicht Woche 2 : 5 mg/kg Körpergewicht Woche 6 : 5 mg/kg Körpergewicht					
Erhaltungsdosis	alle 8 Wochen					alle 2 Wochen, beginnend 4 Wochen nach der zweiten Infusion Infliximab
Lagerung	im Kühlschrank (2°–8°C) Infliximab kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten bei Temperaturen bis maximal 25°C gelagert werden					im Kühlschrank (2°–8°C), lichtgeschützt
Besonderheiten	Dauer der Verabreichung: 1.-3. Infusion mindestens 2 Stunden ab der 4. Infusion mindestens 1 Std.		Beobachtung: während und 1-2 Stunden nach der Infusion Patienten überwachen			
	Verabreichung: nur mit Filter (Porengröße 1,2 μ m)					