

C



Checkliste
Biologika
kompakt-
Vedolizumab

Anti- $\alpha 4\beta 7$ -Integrin-Antikörper Wirkstoff Vedolizumab		
Präparat	Entyvio®	
Hersteller	Takeda	
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa	
Art der Anwendung	intravenös	subkutan
Darreichungsform	300 mg Durchstechflasche	108 mg Fertigspritze/-pen
Induktionsdosis	Woche 0 : 300 mg Woche 2 : 300 mg Woche 6 : 300 mg	
Erhaltungsdosis	alle 8 Wochen	alle 2 Wochen nach mindestens 2 Infusionen, die erste subkutane Dosis sollte anstelle der nächsten geplanten intravenösen Dosis verabreicht werden.
Lagerung	im Kühlschrank (2°–8°C), lichtgeschützt	
		ab Entnahme aus dem Kühlschrank 30 Min. bis zur Verabreichung warten kann bei Bedarf einmalig lichtgeschützt bei Temperaturen bis maximal 25°C bis zu 7 Tage gelagert werden
Besonderheiten	Dauer der Verabreichung: 30 Minuten Beobachtung: 2 Stunden nach der 1. + 2. Infusion, danach jeweils immer 1 Stunde	