



Übersicht zur Impfempfehlung

für erwachsene CED-Patienten vor bzw. während einer Immunsuppression

Quelle: Epidemiologisches Bulletin RKI 05/2023 + Bundesgesundheitsblatt 2019 · 62:494–515

| Impfung | Antikörper Titer vor Impfung | Standardimpfung/ Indikationsimpfung | Impfung <u>vor</u> Start Immunsuppression | Impfung <u>während</u> Immunsuppression | Handelsnamen |
|---------------------------|------------------------------|--|---|--|--|
| TOTIMPFSTOFFE | | | | | |
| Tetanus-Diphtherie | nein | Standardimpfung | 1 Impfung, falls nicht in den 10 Jahren zuvor | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Td pur® TD Merieux® |
| Poliomyelitis | nein | Standardimpfung | 1 Impfung, falls nicht Grundimmunisierung + einmalige Auffrischung jemals erfolgt ist | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | IPV Merieux® |
| Hepatitis B | ja (anti HBs) | Standardimpfung | 3 Impfungen, falls keine AK-Titer. Evtl. Zusatzimpfung nach Titerkontrolle | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Engerix® HBVAXPRO® Fendrix® HEPLISAV B® |
| Influenza | nein | Indikationsimpfung | jährlich-saisonal im Herbst | jährlich-saisonal im Herbst | jährlich wechselnd |



| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | | |
| Pneumokokken | ja, vor Wiederholung - Impfung | Indikationsimpfung | 2 Impfung (13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung | 2 Impfung (13 valenten Konjugat + PPSV 23), nach 6 Jahren evtl. 1x Wiederholung | Pneumovax® Prevenar® Synflorin® |
| Humanes Papilloma Virus (HPV) | nein | Standardimpfung | 2-3 Impfungen | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Gardasil 9® Cervarix® |
| Herpes zoster | Bei Pat. > 50 Jahren nicht notwendig | Indikationsimpfung | 2 Impfungen | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Shingrix® CAVE: Zostavax® ist ein Lebendimpfstoff |
| Pertussis | nein | Standardimpfung | Auffrischung mit TD in Kombination für Erwachsene | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Monoimpfstoff nicht vorhanden |
| FSME | nein | Indikationsimpfung | 2-3 Impfungen, Risikogebiete in Deutschland beachten! | Möglich, Empfehlung: in der Mitte des Applikationszyklus | Encepur® FSME Immun® |

LEBENDIMPFSTOFFE

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| Masern-Mumps-Röteln | ja, bei unklarer Impfsituation / Infektanamnese | Impfung kontraindiziert! | ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u> mind. 4-6 Wochen vor Start der Immunsuppression mind. 3 Monate nach Ende einer Immunsuppression | Nein! Impfung kontraindiziert! | Priorix® M-M-RVAX-PRO® |
| Varizellen | ja, bei unklarer | Impfung kontraindiziert! | ja, bzw. Auffrischimpfung <u>Impfabstand:</u> | Nein! | Varilix® |



| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| | Impfsituation / Infektanamnese | | mind. 4-6 Wochen vor Start der Immunsuppression mind. 3 Monate nach Ende einer Immunsuppression | Impfung kontraindiziert! | Varivax® |
| Gelbfieber | nein | Impfung kontraindiziert! | Einmalige Impfung, Auffrischung nach 10 Jahren möglich | Nein! Impfung kontraindiziert! | Stamaril® |

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Stand Oktober 2023