



Anti Interleukin-12/23 Antikörper Wirkstoff Ustekinumab				
Präparat	Stelara®	Pyzchiva®	Wezenla®	Uzpruvo®
Hersteller	Johnson & Johnson	Sandoz	Amgen	Stada
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn
Art der Anwendung	Intravenös und subkutan			<u>nur</u> subkutan
Darreichungsform	130 mg Durchstechflasche	90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (ein Pen ist nur für Stelara® verfügbar)		90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze
Induktionsdosis	<u>Woche 0:</u> ≤ 55 kg 260 mg > 55 kg bis ≤ 85 kg 390 mg > 85 kg 520 mg		<u>Woche 8:</u> 90 mg	<u>Woche 0:</u> anderes Ustekinumab verwenden <u>Woche 8:</u> 90 mg
Erhaltungsdosis	alle 8 - 12 Wochen			alle 8 - 12 Wochen
Lagerung	im Kühlschrank (2°C – 8°C), lichtgeschützt			
	Fertigspritze + Pen: einmalig bei Raumtemperatur (bis zu 30°C) für maximal 30 Tage			
Besonderheiten	<u>Infusion:</u> Dauer der Verabreichung: mindestens 1. Stunde Verabreichung: mit extra Filter Porengröße 0,2 µm Nachbeobachtung: keine Vorgabe des Herstellers			