



Interleukin-23-Antikörper Wirkstoff Mirikizumab				
Präparat	Omvoh®			
Hersteller	Lilly			
Anwendungsgebiet	Colitis ulcerosa		Morbus Crohn	
Art der Anwendung	intravenös	subkutan	intravenös	subkutan
Darreichungsform	300 mg Durchstechflasche	200 mg Fertigspritze/-pen	300 mg Durchstechflasche	200 mg Fertigspritze/-pen 100 mg Fertigspritze/-pen
Induktionsdosis	Woche 0 : 300 mg Woche 4 : 300 mg Woche 8 : 300 mg		Woche 0 : 900 mg Woche 4 : 900 mg Woche 8 : 900 mg	
Erhaltungsdosis		200 mg alle 4 Wochen nach Abschluss der Induktionsphase		300 mg alle 4 Wochen nach Abschluss der Induktionsphase
Lagerung	im Kühlschrank (2°–8°C), lichtgeschützt			
	Fertigspritze/-pen: ungekühlt bis zu 2 Wochen bei einer Temperatur nicht über 30°C			
intravenöse Infusion: Verdünnung	50 – 250 ml NaCl 0,9% oder Glucose 5%		100 – 250 ml NaCl 0,9% oder Glucose 5%; Zunächst 45 ml Verdünnungsmittel aus dem Infusionsbeutel entnehmen	
Verabreichung	mindestens über 30 Minuten		mindestens über 90 Minuten	
Spülung	mit NaCl 0,9% oder Glucoselösung 5%, mit der gleichen Flussrate wie die Verabreichung von Omvoh; Die Zeit, die für das Spülen der Omvoh-Lösung benötigt wird, wird zur Infusionsdauer addiert			
Besonderheiten				