

## Berechnung Mayo-Score (CU)

Kriterium	Punkte	Punkte
Stuhlfrequenz pro Tag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normal: 0</li> <li>• 1-2 Stühle: 1</li> <li>• 3-4 Stühle: 2</li> <li>• &gt; 5 Stühle: 3</li> </ul>	
Rektaler Blutabgang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kein Blut: 0</li> <li>• Blutstreifen bei weniger als 50% der Stühle: 1</li> <li>• Deutliche Blutbeimengung meistens: 2</li> <li>• Auch Blut ohne Stuhl: 3</li> </ul>	
Endoskopischer Befund	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normaler Befund oder inaktive Erkrankung: 0</li> <li>• milde Colitis (Erythem, leicht spröde Schleimhaut): 1</li> <li>• moderate Colitis (deutliches Erythem, Erosionen, Gefäßmuster verschwunden): 2</li> <li>• schwere Colitis (Ulzerationen, spontane Blutungen): 3</li> </ul>	
Globale Beurteilung des Arztes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normal: 0</li> <li>• milde Erkrankung: 1</li> <li>• moderate Erkrankung: 2</li> <li>• schwere Erkrankung: 3</li> </ul>	
Summe		

2 bis 5 Punkte entsprechen einer milden, ab 6 Punkte einer moderaten bis schweren Erkrankung.