



Interleukin-23-Antikörper Wirkstoff Guselkumab

Präparat	Tremfya®	
Hersteller	Johnson & Johnson	
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn und Colitis ulcerosa	
Art der Anwendung	Intravenös	subkutan
Darreichungsform	200 mg Konzentrat in einer Durchstechflasche 200 mg Fertigpen / -spritze 100 mg Fertigpen / -spritze	
Induktionsdosis	Woche 0: 200 mg i.v. Woche 4: 200 mg i.v. Woche 8: 200 mg i.v.	Woche 0: 2 x 200 mg s.c. ODER Woche 4: 2 x 200 mg s.c. Woche 8: 2 x 200 mg s.c.
Erhaltungsdosis	<p>100 mg s.c. 8 Wochen nach der dritten Induktionsdosis, danach alle 8 Wochen</p> <p>Falls kein ausreichender Nutzen nach der Induktion festgestellt wird: 200 mg s.c. alle 4 Wochen ab Woche 12</p>	
Lagerung	im Kühlschrank (2°–8°C), lichtgeschützt im Umkarton aufbewahren	
Besonderheiten	<p>Verdünnung des Konzentrats zur Herstellung der intravenösen Infusionslösung in 250 ml NaCl 0,9 %</p> <p>Verabreichung der Infusion mindestens über 1 Stunde</p> <p>Nur mit 0,2 µm Filter verabreichen!</p> <p>Nachbeobachtung: keine Vorgabe des Herstellers</p>	