



Anti-TNF-α-Antikörper Wirkstoff Infliximab					
Präparat	Remicade®	Flixabi®	Remsima®	Zessly®	Remsima®
Hersteller	MSD	Biogen	Celltrion	Sandoz	Celltrion
Art der Anwendung	intravenös				subkutan
Darreichungsform	100 mg Durchstechflasche				120 mg Fertigspritze/-pen
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa				
Induktionsdosis	Woche 0: 5 mg/kg Körpergewicht Woche 2: 5 mg/kg Körpergewicht Woche 6: 5 mg/kg Körpergewicht				
Erhaltungsdosis	alle 8 Wochen				alle 2 Wochen, beginnend 4 Wochen nach der zweiten Infusion Infliximab
Lagerung	im Kühlschrank (2°–8°C) Infliximab kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten bei Temperaturen bis maximal 25°C gelagert werden				im Kühlschrank (2°–8°C), lichtgeschützt
Besonderheiten	Dauer der Verabreichung: 1.-3. Infusion mindestens 2 Stunden ab der 4. Infusion mindestens 1 Std.		Beobachtung: während und 1-2 Stunden nach der Infusion Patienten überwachen		Dosiserhöhung auf 240mg alle 2 Wochen möglich bei MC!
	Verabreichung: nur mit Filter (Porengröße 1,2µm)				