



anti-TNF-alpha-Antikörper Wirkstoff Infliximab				
Art der Anwendung	intravenös			
Präparat	Remicade®	Flixabi®	Zessly®	Remsima®
Hersteller	Johnson & Johnson	Biogen	Sandoz	Celltrion
Darreichungsform	Durchstechflasche: 100 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung			Durchstechflasche: 100 mg Konzentrat 350 mg Konzentrat
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa			
Induktionsdosis	Woche 0 : 5 mg/kg Körpergewicht Woche 2 : 5 mg/kg Körpergewicht Woche 6 : 5 mg/kg Körpergewicht			
Erhaltungsdosis	alle 8 Wochen oder Umstellung auf Remsima® s.c. 120 mg alle 2 Wochen in Woche 6 <i>Details siehe Seite 2 (Subkutane Anwendung)</i>			
Lagerung	im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C) Infliximab als Pulver kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten bei Temperaturen bis maximal 25 °C gelagert werden Infliximab als Konzentrat kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 15 Tagen bei Temperaturen bis maximal 30 °C gelagert werden			
Besonderheiten	Dauer der Verabreichung: 1.- 3. Infusion mindestens 2 Stunden ab der 4. Infusion mindestens 1 Stunde Verabreichung: nur mit Filter (Porengröße 1,2 µm) Beobachtung: während und 1 – 2 Stunden nach der Infusion Patienten überwachen			
CAVE	Remsima®-Konzentrat 100 mg und 350 mg zur Herstellung einer Infusionslösung ist bei hereditärer Fruktoseintoleranz kontraindiziert!			



Art der Anwendung	subkutan
Präparat	Remsima®
Hersteller	Celltrion
Darreichungsform	120 mg Fertigspritze oder Fertigpen
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
Therapiebeginn	Frühestens 4 Wochen nach der zweiten Infusion - Details siehe Seite 1 (Intravenöse Anwendung) Oder auch später im Verlauf anstatt einer erneuten Infusion möglich!
Erhaltungsdosis	alle 2 Wochen
Lagerung	im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) lichtgeschützt
Besonderheiten	Eine Dosiserhöhung auf 240 mg alle 2 Wochen ist möglich, aber nur, bei Morbus Crohn!