



Anti Interleukin-12/23 Antikörper Wirkstoff Ustekinumab					
Präparat	Stelara®	Fymiskina®	Imuldosa®	Otulfli®	Pyzchiva®
Hersteller	Johnson & Johnson	Ratiopharm	Accord Healthcare	Fresenius Kabi	Sandoz
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn
Art der Anwendung	intravenös und subkutan				
Darreichungsform	130 mg Durchstechflasche			90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (ein Pen ist aktuell noch nicht für alle verfügbar)	
Induktionsdosis	<u>Woche 0:</u> ≤ 55 kg 260 mg > 55 kg bis ≤ 85 kg 390 mg > 85 kg 520 mg			<u>Woche 8:</u> 90 mg	
Erhaltungsdosis	alle 8 - 12 Wochen				
Lagerung	im Kühlschrank (2°C – 8°C), lichtgeschützt				
	Fertigspritze & Pen: einmalig bei Raumtemperatur (bis zu 30°C) für maximal 30 Tage				
Besonderheiten	<u>Infusion:</u> Verabreichung: mit extra Filter Porengröße 0,2 µm			Dauer der Verabreichung: mindestens 1 Stunde Nachbeobachtung: keine Vorgabe des Herstellers	



Präparat	SteQeyma®	Usymro®	Wezenla®	Yesintek®	Uzpruvo®
Hersteller	Celltrion	Gedeon Richter Plc.	Amgen	Biocon Biologics	Stada
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn	Morbus Crohn
Art der Anwendung	intravenös und subkutan				<u>nur</u> subkutan
Darreichungsform	130 mg Durchstechflasche		90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze (ein Pen ist aktuell noch nicht für alle verfügbar)		90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze
Induktionsdosis	<u>Woche 0:</u> ≤ 55 kg 260 mg > 55 kg bis ≤ 85 kg 390 mg > 85 kg 520 mg		<u>Woche 8:</u> 90 mg		<u>Woche 0:</u> anderes Ustekinumab verwenden <u>Woche 8:</u> 90 mg
Erhaltungsdosis	alle 8 - 12 Wochen				
Lagerung	im Kühlschrank (2°C – 8°C), lichtgeschützt				
	Fertigspritze & Pen: einmalig bei Raumtemperatur (bis zu 30°C) für maximal 30 Tage				
Besonderheiten	<u>Infusion:</u> Verabreichung: mit extra Filter Porengröße 0,2 µm		Dauer der Verabreichung: mindestens 1 Stunde Nachbeobachtung: keine Vorgabe des Herstellers		