



Anti-TNF- α -Antikörper Wirkstoff Golimumab			
Präparat	Simponi®	Gobivaz®	Gotenfia®
Hersteller	Johnson & Johnson	Advanz Pharma	Stada
Art der Anwendung	subkutan		
Darreichungsform	vorgefüllter Injektor: 50 mg / 100 mg Fertigspritze: 50 mg / 100 mg	Fertigspritze: 50 mg / 100 mg Fertigpen: 50 mg / 100 mg	Fertigspritze: 50 mg / 100 mg Fertigpen: 50 mg / 100 mg
Anwendungsgebiet	Colitis ulcerosa		
Induktionsdosis	Woche 0 : 200 mg Woche 2 : 100 mg		
Erhaltungsdosis	< 80 kg Körpergewicht: 50 mg alle 4 Wochen bei unzureichendem Ansprechen in W 6 : 100 mg alle 4 Wochen ≥ 80 kg Körpergewicht: 100 mg alle 4 Wochen		
Lagerung	im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C), nicht einfrieren, lichtgeschützt ab der Entnahme aus dem Kühlschrank 30 Minuten bis zur Verabreichung warten		
Einmalige Aufbewahrung	für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen bei Temperaturen bis maximal 25 °C		