

Checkliste Biologika kompakt - Infliximab

anti-TNF-alpha-Antikörper Wirkstoff **Infliximab**				
Art der Anwendung	**intravenös**			
Präparat	Remicade®	Flixabi®	Zessly®	Remsima®
Hersteller	Johnson & Johnson	Biogen	Sandoz	Celltrion
Darreichungsform	Durchstechflasche: 100 mg Pulver zur Herstellung einer Lösung			Durchstechflasche: 100 mg Konzentrat 350 mg Konzentrat
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa			
Induktionsdosis	Woche **0**: 5 mg/kg Körpergewicht Woche **2**: 5 mg/kg Körpergewicht Woche **6**: 5 mg/kg Körpergewicht			
Erhaltungsdosis	**alle 8 Wochen** oder Umstellung auf Remsima® s.c. 120 mg alle 2 Wochen in Woche 6 *Details siehe Seite 2 (Subkutane Anwendung)*			
Lagerung	im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C) Infliximab als **Pulver** kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten bei Temperaturen bis maximal 25 °C gelagert werden		Infliximab als **Konzentrat** kann einmalig über einen Zeitraum von bis zu 15 Tagen bei Temperaturen bis maximal 30 °C gelagert werden	
Besonderheiten	**Dauer der Verabreichung:** 1.- 3. Infusion mindestens 2 Stunden ab der 4. Infusion mindestens 1 Stunde **Verabreichung:** nur mit Filter (Porengröße 1,2 µm)		**Beobachtung:** während und 1 – 2 Stunden nach der Infusion Patienten überwachen **Dosis:** >1000 mg IFX in 500 ml NaCl infundieren!	
CAVE	Remsima®-Konzentrat 100 mg und 350 mg zur Herstellung einer Infusionslösung ist bei hereditärer Fruktoseintoleranz kontraindiziert!			



Checkliste Biologika kompakt - Infliximab

Art der Anwendung	**subkutan**
Präparat	Remsima®
Hersteller	Celltrion
Darreichungsform	120 mg Fertigspritze oder Fertigpen
Anwendungsgebiet	Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
Therapiebeginn	Frühestens 4 Wochen nach der **zweiten** Infusion - Details siehe Seite 1 (Intravenöse Anwendung) Oder auch später im Verlauf anstatt einer erneuten Infusion möglich!
Erhaltungsdosis	alle 2 Wochen
Lagerung	im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) lichtgeschützt
Besonderheiten	Eine Dosiserhöhung auf 240 mg alle 2 Wochen ist möglich, aber nur, bei **Morbus Crohn**!